

# AVOTAN®



Antiparasitário interno e externo para bovinos.

## Resumo da bula

Antiparasitário interno e externo para bovinos.

AVOTAN® é uma solução injetável de Abamectina a 1% p/v, pronta para uso.

Uma única dose trata e controla eficazmente as parasitoses internas e externas dos bovinos.

AVOTAN® possui amplo espectro, excepcional atividade antiparasitária e grande margem de segurança.

Fácil de aplicar, AVOTAN é muito bem tolerado. Podendo também ser aplicado por via intramuscular, torna-se particularmente adequado para o tratamento das parasitoses.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Abamectina ..... 1,0 g

Veículo q.s.p. .... 100,0 mL

### Indicações do produto:

AVOTAN® é um endectocida de amplo espectro de ação para bovinos que combate os nematódeos gastrointestinais (tais como: *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei* e *Trichostrongylus colubriformis*), tem ação bernicida (Larva de *Dematobia hominis*) e auxilia no controle do carrapato dos bovinos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*).

Dosagem:

Bovinos: A dose empregada é de 1 mL para 50 kg de peso, correspondente a 200 mg de Abamectina por kg de peso.

Faixa de Peso (kg)	Volume da Dose(mL)	Faixa de Peso(kg)	Volume da Dose(mL)
de 51 – 100	2	de 351 – 400	8
de 101 – 150	3	de 401 – 450	9
de 151 – 200	4	de 451 – 500	10
de 201 – 250	5	de 501 – 550	11
de 251 – 300	6	de 551 – 600	12
de 301 – 350	7		

Para os animais mais pesados, como os touros, manter a mesma proporção de 1 mL para cada 50 kg de peso.

#### **Via de Administração:**

A aplicação pode ser feita por via subcutânea ou intramuscular. Injetar o produto sob a pele solta nas áreas do pescoço, na frente ou atrás da paleta, ou no músculo do pescoço. Utilizar agulhas de calibre 16 e comprimento de 10 a 15 mm para injeções subcutâneas e de 20 a 25 mm para injeções intramusculares. Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia.

#### **Advertências:**

- Não tratar bovinos com menos de 16 semanas de idade;
- Não utilizar em animais debilitados ou estressados;
- Não utilizar em animais convalescentes;
- Não utilizar dosagem acima da recomendada, isto é, 1mL/50 kg de peso.

#### **Apresentação:**

Frasco de polipropileno contendo 500 mL e 1 litro.

#### **Conservação:**

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance das crianças.

#### **Períodos de Carência:**

Bovinos:

**Abate – O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 28 dias após a última aplicação;**

**Leite- Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite pra o consumo humano.**