

Resumo da bula

Para a terapêutica de infecções por agentes Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis à Sulfadoxina e Trimetoprima.

BORGAL® é um quimioterápico composto de duas substâncias ativas, que interferem, com ação bloqueadora, em dois pontos distintos na biossíntese das bactérias e potenciam reciprocamente seu efeito até o bactericida.

Fórmula

Cada 100 mL contém:

Sulfadoxina	20,00 g
Trimetoprima	4,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Indicações

Doenças infecciosas bacterianas primárias e infecções bacterianas secundárias no decurso de doenças provocadas por vírus em bovinos e equinos, tais como:

- **BOVINOS:**
Pneumonia e Infecções respiratórias (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pasteurella multocida*); **Enterites** (*Escherichia coli*, *Salmonella enterica*); **Listeriose** (*Listeria monocytogenes*); **Nefrites, Abscessos, Piodermites, Cistites** (*Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium bovis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*); **Mastites** (*Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium bovis*); **Onfaloflebite** (*Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*); **Pododermatite** (*Fusobacterium necrophorum*, *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*).
- **Equinos:**
Pneumonia e Infecções respiratórias (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus equi*, *Streptococcus pyogenes*); **Enterites** (*Escherichia coli*); **Nefrites, Abscessos, Piodermites, Cistites** (*Streptococcus equi*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*); **Mastites** (*Streptococcus equi*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*); **Onfaloflebite** (*Streptococcus equi*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*).

Posologia e Modo de Usar

A dose de referência para todos os animais é de 3 mL do produto **Borgal®** para cada 50 kg de peso, equivalente a 12,0 mg de sulfadoxina/kg de peso vivo e 2,4 mg de trimetoprima/kg de peso vivo, em dose única, tanto pela via intravenosa quanto pela via intramuscular.

Aplicação

- Bovinos – vias endovenosa e intramuscular.
- Equinos – de preferência por via endovenosa, podendo ser usada também a via intramuscular.

Advertência

Evitar administrar mais do que 10 mL no mesmo local de aplicação, quando utilizado pela via intramuscular.

Após administração intramuscular pode ocorrer a formação de um nódulo transitório.

Não aplicar em animais que apresentem glomerulonefrite ou insuficiência renal aguda.

Não aplicar em animais com histórico de hipersensibilidade às Sulfonamidas.

Em casos esporádicos, a solução do produto conservada a baixas temperaturas pode apresentar pequenos cristais, facilmente elimináveis mediante ligeiro aquecimento em banho-maria.

Períodos de Carência:

Bovinos: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

Equinos: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

Apresentação:

Frasco-ampola de vidro com 5, 10 e 50 mL.