

Resumo da bula

Antibiótico injetável à base de Cefquinoma do grupo das Cefalosporinas, com alta eficiência no combate aos germes Gram positivos e Gram negativos, relacionados com as principais doenças que acometem os bovinos e suínos.

Sua atuação é pela inibição da síntese da parede celular bacteriana. Possui ainda uma alta estabilidade contra as Penicilinas e β lactamases.

Indicações:

Cobactan® por ser um antibiótico de largo espectro, é indicado no combate as doenças causadas por germes Gram positivos e Gram negativos, sensíveis à Cefquinoma, como:

- Infecções do Aparelho Gastrointestinal Causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, *Clostridium spp*, *Klebsiella spp* e outros.
- Infecções do Aparelho Respiratório Causadas por *Haemophilus spp*, *Pasteurella spp*, *Corynebacterium pyogenes*, *Bordetella bronchiseptica*, *Moraxella bovis* e outros.
- Infecções do Aparelho Genitourinário Causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Corynebacterium pyogenes*, *Proteus spp*, *Pseudomonas* e outros.
- Infecções do Úbere (mastites) Causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes* e outros.
- Infecções Piodermatites, Podridão do pé Onfaloflebites, Abscessos Causadas por *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Corynebacterium pyogenes*, *Klebsiella spp*, *Fusobacterium spp*, *Bacterodes spp* e outros.
- Síndrome da Agalaxia (MMA) Causadas por *Escherichia coli*, *Streptococcus spp*, *Klebsiella spp* e outros.

Dosagem e Modo de Usar:

A dosagem indicada é de 1 mL de Cobactan® para 25 kg de peso (equivalente a 1 mg de Cefquinoma por kg), diariamente, durante 3 a 5 dias, por via intramuscular.

Contra-Indicações:

A hipersensibilidade às Cefalosporinas é rara, mas o Cefquinoma não poderá ser administrado em animais que demonstrem hipersensibilidade aos antibióticos β lactâmicos.

Conservação:

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Período de Carência: Bovinos – Abate- O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 5 dias após a última aplicação.

Leite- O leite dos animais tratados não deve ser destinado ao consumo humano até 12 horas após a última aplicação.

Suínos – Abate- O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 5 dias após a última aplicação.

Apresentação: Frasco-ampola de 50 e 100 mL.