

## Resumo Da Bula

Anti-helmíntico de largo espectro em suspensão, para uso oral, no combate dos principais nematódeos gastrintestinais dos bovinos e dos principais helmintos parasitos dos cães e da giardíase.

### AGITE ANTES DE USAR

#### Fórmula

Cada 1 mL contém:

Fembendazol ..... 100 mg

Veículo q.s.p. .... 1 mL

#### Indicações

PANACUR® 10% é indicado:

**Cães:** No tratamento e controle dos principais helmintos parasitos de cães, tais como: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense* e *Toxocara canis* e da giardíase.

**Bovinos:** No tratamento e controle dos principais nematódeos gastrintestinais dos bovinos, tais como: *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata* e *Oesophagostomun radiatum*.

#### Dosagem e Modo de Usar

Uso oral

**Cães:** 100 mg de Fembendazol/Kg de peso em DOSE ÚNICA ou 50 mg de Fembendazol/Kg de peso, por dia, durante 3 dias consecutivos.

**Bovinos:** 5 mg de Fembendazol/Kg de peso em DOSE ÚNICA.

#### Período de Carência:

**Bovinos:**

Abate- O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 11 dias após a última aplicação.

Leite- O leite dos animais tratados não deve ser destinado ao consumo humano até 5 dias após a última aplicação.

**Apresentação:** Frascos de 20 mL e de 1 L.

Após aberto o frasco, usar imediatamente todo o conteúdo.

#### Conservação:

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.